



กัญชาในเด็กและวัยรุ่น

จัดทำโดย
นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 5

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า



กัญชา (Marijuana)

ส่วนประกอบ

ทีเอชซี (THC)

ซีบีดี (CBD)

เดลต้าไนท์ทีเอชซี
(delta-9 THC)

ผลข้างเคียง

อ่อนคลาย ลดความกังวล ลดความเจ็บปวด

เคลิ้ม เมา

เสพติด



ผลของกัญชาต่อเด็ก

พืชระยะเฉียบพลัน



ระบบประสาท

เวียนศีรษะ
แขนขาอ่อนแรง
พูดไม่ชัด
ความรู้สึกตัวลดลง
สับสน เดี๋ยวเซ ชัก
กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก
อารมณ์แปรปรวน
เห็นภาพหลอน



ระบบหัวใจ

หน้ามืด วูบหมดสติ
ใจสั่น แน่นหน้าอก
ชีพจรเต้นผิดจังหวะ
เหนื่อย หายใจไม่สะดวก
ความดันโลหิตสูง



ระบบทางเดินอาหาร

คลื่นไส้
อาเจียน
ปวดท้อง

ผลระยะยาวต่อสมองเด็ก



ความคิด ความจำ แ่ย่งลง

มีนงง ปวดหัว สมาธิสั้น



อ่อนล้า เพลียง่าย ง่วงบ่อย

โรคหลอดเลือดสมอง

ประสาทหลอน หูแว่ว



ซึมเศร้า พฤติกรรมเปลี่ยน

การตัดสินใจควบคุมลดลง

การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็ก

พิจารณาใช้ส่วนประกอบของกัญชา เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์
เช่น

- การรักษาประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
- โรคลมชักรักษายากบางชนิด

**ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเท่านั้น**



อ้างอิง: คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ แพทยสภา



กัญชา

VS

เด็ก

- สารในกัญชา มีผลกระทบต่อสมองเด็ก ทำให้เสพติดได้
- **หลีกเลี่ยง**บริโภคขนม อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา
- **ห้าม**ใช้กัญชาในเด็ก และวัยรุ่น **อายุน้อยกว่า 20 ปี**
(ยกเว้นการใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น)

อ้างอิง: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (9 มิถุนายน 2565)



จัดทำโดย

นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 5

- นพท. พีรวัส พันธุ์มีเกียรติ
- นพท. ภาสวิชญ์ สุขพิศ
- นพท. ภูพาน กิรินีพนธ์พนธ์
- นพท. ศิรดา ศรีโรจนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา: พ.ต.ทิม เพชรทอง

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า